

	co?	kdy?	jak?	čím?	koncentr.	expozice	účinnost
ruce	mytí rukou	po příchodu na směnu, při viditelném znečištění, po použití toalety, před jídlem	vodou a mycí emulzí	ESEMTAN WASHLOTION			
	dezinfekce rukou	před a po kontaktu s pacientem, po kontaktu s kontaminovaným materiálem, ZP po sundání rukavic	hygienická dezinfekce rukou: vtírat do suchých rukou min.3ml tak, aby ruce byly po celou dobu aplikace vlhké. V případě TBC aplikovat 2x dezinfekční mytí a hygien. dezinfekce rukou dezinfekční mytí těla a vlasů	DESDERMAN N sol./gel etanol+bifenyolol	koncentrát	30s	ABTMV,MRSA
				SENSIVA propanoly + kys.mléčná	koncentrát	30s	A(B)MV,MRSA
				DESMANOL propanol+chlorhexidin	koncentrát	30s	A(B)TMV,MRSA
				PRIMASEPT MED alkohol+dras.mýdlo	koncentrát	1min.	A(B)MV,MRSA
				OCTENISAN octenidin + tenzidy	koncentrát	1-3min.	A(B)V,MRSA
		před zákroky	chirurgická dezinfekce rukou: vtírat do suchých rukou až po předloktí a k loktům	DESDERMAN N sol./gel etanol+bifenyolol	koncentrát	1,5 min.	ABTMV,MRSA
				DESMANOL propanol+chlorhexidin	koncentrát	3 min.	ABTMV,MRSA
	péče o ruce	před začátkem směny v průběhu směny při pocitu vysušené pokožky po skončení směny	vetřít do pokožky rukou	ESEMTAN HAUTBALSAM emulg.olej ve vodě			
pokožka tělo	kůže	před vpichy injekcí, kanylací katerizací, operační pole pacienta	dokonale potřítk tamponem nebo postříkat	KODAN FORTE bar./bezb. etanol+bifenyolol+peroxid	koncentrát OP-koncentrát	15s 60s	A(B)TMV
				OCTENIDERM octenidin+ alkohol	koncentrát OP-koncentrát	15s 60s	ABTMV
	sliznice	dezinfekce sliznic, uro-gyn	dokonale smočit, postříkem, macerací, výplachem	OCTENISEPT octenidin+voda	koncentrát	1-2min.	A(B)MV,MRSA
	prevence plísni nohou	denně dle potřeby	postříkat ponožky, obuv	KODAN FORTE bezbarvý etanol+bifenyolol+peroxid	koncentrát	1 min.	A(B)TMV
nástroje, pomůcky	instrumentárium, anesteziologické příslušenství, pomůcky z kovu, sklo, plasty	po použití	předčištění a dezinfekce: zcela ponořit do připraveného roztoku, nástroje rozevřít a zajistit, aby všechny části byly smočeny,po vytažení opláchnout vodou a osušit	GIGASEPT INSTRU AF aminy + KAS	3% 2%	15min 30min.	A(B)TMV, MRSA
				GIGASEPT AF aminy+alkylglycin	4% 2%	15min. 30min.	A(B)TMV,MRSA

Dezinfekční řád

str.2

	co?	kdy?	jak?	čím?	koncentr.	expozice	účinnost
plochy povrchy inventář	vyšetřovací a zákrové stoly, vozíky, lehátka...	po kontaminaci, mezi vyšetřeními, dle potřeby	postřikem postřikem dokonale smočit plochu a nechat zaschnout	MIKROZID liquid alkoholy	koncentrát	1-2min.	ABTMV, MRSA
	plochy a povrchy z citl. materiálů plexisklo, ...	dle potřeby	dokonale smočit. nechat působit a opláchnout (Terralin se nemusí oplachov.)	TERRALIN protect benzalkoniumchlorid+alkoh	0,50% 1%	60min. 30min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA
				PERFORM aktivní kyslík	0,50% 1,00%	60min. 30min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA
	vlastní úklid mimo úklidovou firmu: podlahy, stoly, nábytek, parapety, postele, lehátka, vozíky, koše, kliky	vyšetřovny: 3x denně lůžkové pokoje: 2x denně chodby, pokoje: 2x denně sesterský pokoj: 2x denně WC, koupelny: 2x denně jídlna: 1x denně kuchyňka, úkl. místnost: 2x denně velký úklid: 1x týdně	vlhkým způsobem připraveným pracovním roztokem vytřít vlhkým způsobem nebo umýt a nechat zaschnout	BURATON 10F aldehydy epidemie	0,50% 1% 3%	60min. 30min. 4h	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA ABCTMV
				TERRALIN protect benzalk. chlorid+alkohol	0,50% 1% koncentrát	60min. 30min. 5min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA
				PERFORM aktivní kyslík	0,50% 1,00%	60min. 30min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA
				BURATON 10F aldehydy	0,50% 1%	60min. 30min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA
	podložní mísy, močové láhve, odsávací láhve, hadice apod.	ihned po použití	dokonale smočit, mechanicky vyčistit, opláchnout				

Zdrav.zařízení