



produktová informace

schülke

Octenidol

250 ml



Indikace: Regenerace ústní mikroflóry při zánětlivých onemocněních dutiny ústní.
Terapie agresivní i chronické parodontitidy.
Před a po orálních chirurgických intervencích.
Podpora eradikace MRSA kolonizací.
Hygiena dutiny ústní u ventilovaných pacientů.
Hygiena dutiny ústní s implantáty a náhradami.

Charakteristika:

Antiseptická farmaceutická substance octenidinhydrochlorid (aktivní patent) ve vodním roztoku, určená k regeneraci ústní flóry při zánětech ozubice - periodontitis, zánětech sliznic a dásní (gingivitis) a pro důkladnou denní hygienu dutiny ústní a krku.

Spektrum účinku:

baktericidní, fungicidní (vč. *C.albicans* - 99,9%/1 min.), plísně - 2 min.

Účinná látka je v praxi již od r.1980, od roku 1990 jako slizniční antiseptikum a od roku 1995 se indikace rozšířila i na léčbu ran.

Mikrobiologická účinnost ověřena na 10 reprezentativních kmenech, které jsou nejčastějšími původci zánětů v dutině ústní (expertízy doložitelné na vyžádání). Výborná tolerance sliznicemi a tkáněmi a příjemná chuť.

Rychlý nástup účinku:

do 30 sekund a až 24 hodinové působení v místě aplikace.
Bez systémových vedlejších účinků a bez rezistencí - vhodné rovněž pro gravidní a kojící ženy, pro kojence a děti. Neobsahuje alkohol ani chlorhexidin, **nebarví zubní sklovinu ani dentin.**

Denní používání bez omezení

autorizovaný distributor pro ČR: Nora, a.s.,
Jankovcova 2(TOKOVO), tel: 266 78 29 29,
nora@nora-as.cz

složení 100g roztoku:
0,1g octenidindihydrochloridu
a pomocné látky : glycerin,
PEG 40 hydrogenovaný
ricinový olej, glukonát sodný,
aspartam, kys.citronová,
chuťový korigens(mentol)



Skladujte v originálních obalech za teploty od +1°C do +25°C.
Nenechte zamrznout.

Aplikace: 15 ml 2 - 3x denně po dobu 30 sekund povalovat v ústech a/nebo vykloktat a vyplivnout. Nepolykat. Užití nebrání následnému jídlu ani pití.

Aplikace pro onkologické pacienty: dle doporučení "Ligy proti rakovině" 4x denně a 3x v noci před jídlem. Octenidol je možné ředit 1:1 pokud by chuť byla nepříjemná.

Aplikace pro uměle ventilované pacienty:
a, krátkodobá ventilace: vytírat dobře smočeným tamponem - 2 - 3x denně
b, dlouhodobá ventilace: možno použít měkký smočený kartáček a odsávačku - 2x denně