


Přípravek na bázi alkoholu a chlorhexidin diglukonátu pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.



# Desmanol

Optimální pro suchou pokožku



## Profil

### mikrobiologická účinnost

- Baktericidní (gramnegativní i grampozitivní bakterie (vč. TBC), fungicidní, omezeně virucidní (HBV, HCV, HIV, rotavaccinia viry)
- chrání pokožku před vysušením a odmaštěním ošetřujícími komponenty. Tím je eliminováno poškození kůže při používání alkoholových preparátů.
- aktivní alkoholová složka zaručuje rychlý účinek a oschnutí.
- výborný reziduální efekt.
- využitelný kdekoli - aplikace bez vody a v jakékoliv situaci.

## Charakteristika

### Složení

100 g roztoku obsahuje 4,2 g chlorhexidine digluconatu 20% roztok, 32,251 g 1-propanolu, 20,985 g 2-propanolu, 1-tetradecanolu, macrogolu 4000, nonoxynolu -12, macrogol-iso-octanoatu-220, barvivo E131, aroma, čišťenou vodu.

### Chemicko-fyzikální údaje koncentráту

vzhled	čirý roztok
barva	modrá
hustota	0,90 g/cm <sup>3</sup>
viskozita (20° C)	< 15 sekund (DIN 53211)
pH hodnota	5,5 + 0,5
teplotně stabilní	v intervalu od +2°C do +40°C při -5°C může vločkovatět, avšak při zvýšení teploty nad +10°C je plně reverzibilní
bod vznícení	26,5 °C

## Balení

1 l PE láhev	10 x 1l
10 l PE kanýstr	1 x 10l

## Aplikační pomůcky

dávkovač SM 2  
450 ml tlaková dávkovací pumpička  
(3 ml / 1 dávka)  
1 l tlaková dávkovací pumpička  
(3 ml / 1 dávka)  
10 l klíč ke kanýstru

## Toxicita

LD50 (orálně) hodnocení	= 18,97 ml/kg u potkana relativně neškodný
LD50 (dermálně) hodnocení	> 15 ml/kg u potkana relativně neškodný nedráždí pokožku

## Dávkování a způsob použití

Desmanol® se používá neředěný. Během kontaktního času pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou dbáme na dobré zvlhčení dezinfikované oblasti

Použití	Instrukce
Hygienická dezinfekce rukou	vírat nejméně 3 ml Desmanolu® do suchých rukou po dobu 30 sek.
Chirurgická dezinfekce rukou	po umytí rukou a předloktí mycí emulzí (Esemtan® Washlotion) vírat nejméně 10 ml roztoku (2 x 5 ml) Desmanolu do suchých rukou po dobu nejméně 3 minut tak, aby ruce byly vlhké min. 5 minut
Certifikace dle IfSG pro hygienickou dezinf. oblast A pro Tb	koncentrát - 30 sek 2 aplikace
“ me zikrátkými operačními zákroky je možné expoziční čas zkrátit na 2 min.	
HBV	koncentrát - 3 min.
MAD-test profylaxe	koncentrát - 3 min.
MAD-test Inaktivace	koncentrát - 2 min.
HBsAg-test	koncentrát - 2 min.
HCV(Surrogat-virus BVDV)	koncentrát - 30 sek.
HIV	koncentrát - 1 min.
Vacciniaviry	koncentrát - 30 sek.
Rotaviry	koncentrát - 1 min.

## Upozornění

Při praní prádla postříkaného Desmanolem v chlórštěpících přípravcích (chemoterapeutickým způsobem) se mohou objevit hnědé skvrny. Tyto se neobjeví při použití jiných pracích prostředků (např. deoxydatinových).

## Bezpečnostní pokyny

Pouze pro vnější použití. Při zasažení očí vypláchněte vodou a dle závažnosti konzultujte s lékařem. Zachovávejte Bezpečnostní opatření jako u hořlavých látek. Nepoužívejte te po uplynutí doby použitelnosti.

